

Yさん 女性(80歳) 右大腿骨頸部骨折

既往歴：40歳 高血圧 レニベース内服中
68歳 骨粗鬆症 リンアルファ錠服用中
72歳 ラカ梗塞 バイアスピリン服用中
運動麻痺なし

職業：元中学校の英語教員、現在無職
家族構成：夫は10年前に他界、現在一人暮らし。
娘(50歳)が1人いるが子宮癌で療養中。
会社員の娘の夫(52歳)、大学2年生と
高校3年生の孫あり。

性格：自立心が強い、几帳面

趣味：読書、ガーデニング

嗜好：飲酒は付き合い程度、喫煙歴なし

入院前の様子

中学校の教員として60歳まで勤務し、家庭と仕事を両立。退職後は夫と旅行を楽しんでいたが、15年前に夫が肺癌と診断されてからは夫の看病に専念していた。10年前に夫が他界後は、家に閉じこもって読書をして過ごすことが多くなった。

入院までの経緯

2月9日14時頃に自宅で掃除中、掃除機のコードに引っかかって転倒。その後立ち上がることができず、3時間後に訪れた近所の人に発見され、救急車にて搬送されて入院となった。

現在までの経過

主訴：右大腿骨骨折部の痛み

身体所見：骨折部包帯固定、包帯上出血なし
足背動脈触知可、左右差なし
顔色不良、倦怠感あり

治療：骨折時出血量が多く、2月9日赤血球濃厚液2単位輸血を実施。

食事：高血圧食(減塩6g、1000kcal)

薬物療法：レニベース5mg錠、リンアルファ錠0.5μgを各1錠/日、痛みに対しロキソニン60mg毎食後内服指示あり。

安静度：床上安静、床上排泄

現在(2月10日、入院2日目)の様子

ベッド上安静、膀胱留置カテーテル14Fr挿入中。
スピードトラック2kg牽引中。2月12日に人工骨頭置換術の予定。

データ(2月10日)

身長：156cm 体重：46kg
体温：36.9℃ 血圧：152/90mmHg
脈拍：76回/分 呼吸数：20回/分

<生理検査>

検査	所見
胸部レントゲン	異常なし
心電図	不整あり 心房細動
心エコー	EF：45%
呼吸機能検査	1秒率：68.7% 閉塞性換気障害軽度

<血液検査>

項目	値	項目	値
WBC	8500 / μL	コリンエステラーゼ ^セ	252 U/L
RBC	315×10 ^u L	CK	56 U/L
Hb	7.0 g/dL	アミラーゼ ^セ	115 U/K
Ht	38%	総コレステロール	230
PLT	23万	中性脂肪	145
PT	13秒	BUN	24.6
APTT	38秒	Cr	1.2
INR	1.4	Na	140
出血時間	4	K	4.3
GFR	80	Cl	112
総蛋白(TP)	5.9g/dL	Glu	146
アルブミン	3.1g/dL	HbA1c	7.5
総ビリルビン	3.5mg/dL	CRP	1.2
直接ビリルビン	2.8 mg/dL	D ₂ イマー	20
AST	32 U/L		
ALT	35 U/L		
γ-GTP	45 U/L		
ALP	450 U/L		
LDH	210 U/L		

指示用紙

	指示	備考
安静度	術前：ベッド上 術後：痛みに応じて離床可 術後：1日目から荷重可	
食事	治療食：血圧食 術当日：朝から禁食 アルジネートウォーター1本 術後6時間後より飲水可 術後1日目から開始	
清潔	術前～全身清拭 抜糸後、入浴可能	
不眠時	マイスリー5mg	
発熱(38.0)℃以上	カロナール2錠内服 ボルタリン座薬25mg 1T 6時間あけて3回/日 アセロ静注1000mg点滴	
血圧	収縮時170mmHg以上・80mmHg以下時コール	
疼痛時	ロキソニン錠60mg 1錠 アセロ静注1000mg点滴	
嘔気時	1. プリンペラン1A 静注 2. ナウゼリン座薬	
呼吸	SPO295%以上 Drコール 術後4時間酸素4L投与後OFF	
尿量	100ml/4H尿量以下 ソラクト500mlを100ml/Hで静注	
モニター	術後1日目9時で中止 (心拍数100/分以下、不整脈がない場合)	

Yさんの右大腿骨頸部骨折の手術内容

麻酔：腰椎麻酔＋全身麻酔 筋弛緩剤（ベクロニウム）、カルボカイン 手術時間：2時間30分 出血量：100ml 尿量：100ml 輸液量；500ml 術中状態：麻酔導入時、血圧低下にて昇圧剤投与。 術後栄養管理：末梢静脈からの輸液（帰室後はヴィーン D80/時） 排液管理：カテーテル：創部ドレーン、膀胱留置カテーテル 創部管理：ガーゼで覆われている 帰室時刻：13時30分 病室に帰室した。麻酔医より酸素マスクで3L/h分を明日の朝まで継続の指示があり、酸素ボンベから中央配管に切り替えた。外科医の指示で術前から弾性ストッキングを装着している。	導入：静脈麻酔薬：ディプリパン 維持：酸素＋吸入麻酔剤 術式：右大腿骨骨頭置換術（前方侵入）
---	--

注射指示

内容	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日
	入院		手術日	OP1日目	OP2日目	OP3日目
レニベース5mg 朝1×1	●	●	●	●	●	●
ワンアルファ 3T×3	●	●	●	●	●	●
バイアスピリン100mg 1T×1	●	●	●	●	●	●
ロキソニン 3T×3	●	●	●	●	●	●
ソルラクト 500ml 80ml/h	●	●	● (術前)			
ソルラクト 500ml			●	●	●	●
ソルデム3A 500ml 80ml/h	●	●	●	●	●	●
ソルデム3A 500ml			●			
ラセナゾリン1g 生食100ml			● (術場に)	●	●	
ラセナゾリン1g 生食100ml			●	●	●	
ラセナゾリン1g 生食100ml			●			
Rcc 2単位	●					